# 高等代数试讲 齐次线性方程组的解

试讲人: 李本正 电子科技大学

2025年6月17日

$$\begin{cases}
a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0, \\
a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0, \\
\vdots \\
a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = 0.
\end{cases} (1)$$

$$\begin{cases}
a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0, \\
a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0, \\
\vdots \\
a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = 0.
\end{cases} (1)$$

### 定义

一个形如 Ax = 0 的线性方程组称为**齐次线性方程组**,其中:

- A 是 m × n 的系数矩阵;
- x 是 n 维未知向量;
- 右端是零向量:  $0 \in \mathbb{R}^m$ 。

$$\begin{cases}
a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0, \\
a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0, \\
\vdots \\
a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = 0.
\end{cases} (1)$$

### 定义

一个形如 Ax = 0 的线性方程组称为**齐次线性方程组**,其中:

- A 是 m × n 的系数矩阵;
- x 是 n 维未知向量;
- 右端是零向量:  $0 \in \mathbb{R}^m$ 。

显然, Ax = 0 总有一个解 x = 0 (称为零解)。



$$\begin{cases}
a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0, \\
a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0, \\
\vdots \\
a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = 0.
\end{cases} (1)$$

### 定义

一个形如 Ax = 0 的线性方程组称为**齐次线性方程组**,其中:

- A 是 m × n 的系数矩阵;
- x 是 n 维未知向量;
- 右端是零向量: 0 ∈ ℝ<sup>m</sup>。

显然, Ax = 0 总有一个解 x = 0 (称为零解)。

那么: **什么情况下会存在非零解**呢?

## 非零解的存在条件(一)

设矩阵  $A = (\alpha_1, ..., \alpha_n) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ , 下列命题等价:

- 齐次线性方程组 Ax = 0 有非零解;
- ② 向量组  $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$  线性相关;
- rank(A) < n

## 非零解的存在条件(一)

设矩阵  $A = (\alpha_1, ..., \alpha_n) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ , 下列命题等价:

- 齐次线性方程组 Ax = 0 有非零解;
- ② 向量组  $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$  线性相关;
- rank(A) < n

证明:  $(1) \Rightarrow (2)$ :

若 Ax = 0 有非零解  $x = (k_1, \ldots, k_n)^T \neq 0$ ,则

$$Ax = (\boldsymbol{\alpha}_1, \dots, \boldsymbol{\alpha}_n)(x_1, \dots, x_n)^T = k_1 \boldsymbol{\alpha}_1 + k_2 \boldsymbol{\alpha}_2 + \dots + k_n \boldsymbol{\alpha}_n = 0$$

## 非零解的存在条件(一)

设矩阵  $A = (\alpha_1, ..., \alpha_n) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ , 下列命题等价:

- 齐次线性方程组 Ax = 0 有非零解;
- ② 向量组  $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$  线性相关;
- rank(A) < n

证明:  $(1) \Rightarrow (2)$ :

若 Ax = 0 有非零解  $x = (k_1, \ldots, k_n)^T \neq 0$ ,则

$$Ax = (\boldsymbol{\alpha}_1, \dots, \boldsymbol{\alpha}_n)(x_1, \dots, x_n)^T = k_1 \boldsymbol{\alpha}_1 + k_2 \boldsymbol{\alpha}_2 + \dots + k_n \boldsymbol{\alpha}_n = 0$$

这正是向量组  $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$  的**线性相关**定义:存在不全为零的系数使线性组合为零。

## 非零解的存在条件(二)

 $(2) \Rightarrow (3)$ :

若  $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$  线性相关,则其中至少有一个向量可以被其他向量线性表示,也就是说线性无关的向量个数最多是 n-1,故  $\mathrm{rank}(A)$  最大取值是 n-1,因此

rank(A) < n

## 非零解的存在条件(二)

 $(2) \Rightarrow (3)$ :

若  $\alpha_1,\ldots,\alpha_n$  线性相关,则其中至少有一个向量可以被其他向量线性表示,也就是说线性无关的向量个数最多是 n-1,故  ${\rm rank}(A)$  最大取值是 n-1,因此

 $(3) \Rightarrow (1)$ :

若 rank(A) = r < n, 说明有 n - r > 0 个自由变量。

因此齐次方程组有无穷多解,可以令自由变量取非零值得到非零解。

 $\Rightarrow$  Ax = 0 有非零解

## 非零解的存在条件(二)

 $(2) \Rightarrow (3)$ :

若  $\alpha_1,\ldots,\alpha_n$  线性相关,则其中至少有一个向量可以被其他向量线性表示,也就是说线性无关的向量个数最多是 n-1,故  ${\rm rank}(A)$  最大取值是 n-1,因此

 $(3) \Rightarrow (1)$ :

若 rank(A) = r < n, 说明有 n - r > 0 个自由变量。

因此齐次方程组有无穷多解,可以令自由变量取非零值得到非零解。

 $\Rightarrow$  Ax = 0 有非零解

Ax = 0 有非零解  $\iff \alpha_1, \dots, \alpha_n$  线性相关  $\iff \operatorname{rank}(A) < n$ 

## 齐次线性方程组解的性质

#### 解的性质:

Ax = 0 的解向量的线性组合仍为 Ax = 0 的解。

## 齐次线性方程组解的性质

#### 解的性质:

Ax = 0 的解向量的线性组合仍为 Ax = 0 的解。

证 设  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$  为 Ax = 0 的解向量,则

$$A(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_t\alpha_t) = A(k_1\alpha_1) + A(k_2\alpha_2) + \dots + A(k_t\alpha_t)$$

$$= k_1A\alpha_1 + k_2A\alpha_2 + \dots + k_tA\alpha_t$$

$$= k_1\mathbf{0} + k_2\mathbf{0} + \dots + k_t\mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

所以,  $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_t\alpha_t$  仍为 Ax = 0 的解。

## 齐次线性方程组解的性质

#### 解的性质:

Ax = 0 的解向量的线性组合仍为 Ax = 0 的解。

证 设  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$  为 Ax = 0 的解向量,则

$$A(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_t\alpha_t) = A(k_1\alpha_1) + A(k_2\alpha_2) + \dots + A(k_t\alpha_t)$$

$$= k_1A\alpha_1 + k_2A\alpha_2 + \dots + k_tA\alpha_t$$

$$= k_1\mathbf{0} + k_2\mathbf{0} + \dots + k_t\mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

所以,  $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_t\alpha_t$  仍为 Ax = 0 的解。

#### 结论

齐次线性方程组 Ax = 0 的所有解构成  $\mathbb{R}^n$  中的一个**解空间**(**线性子空间**):

$$W = \{ X \in \mathbb{R}^n | Ax = 0 \}$$

## 解空间的基础解系

Ax = 0 的基础解系: 即 W 的一组基底。

#### 基础解系的性质

对于齐次线性方程组 Ax = 0, 若

$$1^{\circ}$$
  $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_t$ (t

 $2^{\circ}$  Ax = 0 的任一解向量均可由  $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_t$  线性表示,

则  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$  为 Ax = 0 的基础解系。

### 定理 1 及证明

#### 定理 1

设 rank(A) = r < n,则 Ax = 0 有基础解系,且所含向量个数为 n - r,即 dim W = n - r,这里 n 为方程组未知数个数。

### 定理 1 及证明

#### 定理 1

设 rank(A) = r < n,则 Ax = 0 有基础解系,且所含向量个数为 n - r,即 dim W = n - r,这里 n 为方程组未知数个数。

$$A \xrightarrow{\overline{\text{初等行变换}}} B = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1,n-r} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & b_{r1} & \cdots & b_{r,n-r} \\ & & & 0 & \overline{\tau} \end{pmatrix}$$

从而 Ax = 0 的同解方程组变为:

$$\begin{cases} x_1 = -b_{11}x_{r+1} - \dots - b_{1,n}x_n \\ \vdots \\ x_r = -b_{r1}x_{r+1} - \dots - b_{r,n}x_n \end{cases}$$
 (2)

### 定理1的证明(二)

下面构造一组基础解系。将 x<sub>r+1</sub>,...,x<sub>n</sub> 分别取值:

$$\begin{pmatrix} x_{r+1} \\ x_{r+2} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \implies$$
依次得到
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -b_{11} \\ \vdots \\ -b_{r1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -b_{12} \\ \vdots \\ -b_{r2} \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} -b_{1,n-r} \\ \vdots \\ -b_{r,n-r} \end{pmatrix}$$

## 定理1的证明(三)

#### 我们从而可以构造出一组向量:

$$b_{1} = \begin{pmatrix} -b_{11} \\ \vdots \\ -b_{r1} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad b_{2} = \begin{pmatrix} -b_{12} \\ \vdots \\ -b_{r2} \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad b_{n-r} = \begin{pmatrix} -b_{1,n-r} \\ \vdots \\ -b_{r,n-r} \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

## 定理1的证明(三)

#### 我们从而可以构造出一组向量:

$$b_{1} = \begin{pmatrix} -b_{11} \\ \vdots \\ -b_{r1} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad b_{2} = \begin{pmatrix} -b_{12} \\ \vdots \\ -b_{r2} \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad b_{n-r} = \begin{pmatrix} -b_{1,n-r} \\ \vdots \\ -b_{r,n-r} \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

#### 可以证明:

- b<sub>1</sub>,...,b<sub>n-r</sub> 线性无关
- 任意 Ax = 0 的解都可以由它们线性表示

因此:  $b_1, \ldots, b_{n-r}$  构成一组基础解系,维数为 n-r, 即  $\dim W = n-r$ .

### 例子

例 1:解齐次线性方程组 Ax = 0,其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

## 例子

### 例 1:解齐次线性方程组 Ax = 0,其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

解:对系数矩阵 A 行化简后得到行阶梯型矩阵:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = -x_3 \\ x_1 = x_3 \end{cases}$$

## 例子

#### 例 1:解齐次线性方程组 Ax = 0,其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

解:对系数矩阵 A 行化简后得到行阶梯型矩阵:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = -x_3 \\ x_1 = x_3 \end{cases}$$

构造基础解系:

其中  $(1,-1,1)^T$  为基础解系。

## 小结

#### 通过本节课程, 我们学会了

- 齐次线性方程组的定义
- 齐次线性方程组非零解的存在性条件
- 求解齐次线性方程组的非零解 (构造基础解系)